

CASO CLÍNICO · PERRO

Piometra a cuello cerrado en una golden retriever de 10 años

Camila Rojas Vaca¹, Rodrigo Añez Suárez²

¹ Clínica veterinaria particular, Santa Cruz de la Sierra

² Clínica veterinaria particular, Santa Cruz de la Sierra

Correspondencia: muestra1@example.com · 28 de septiembre de 2026

DATOS DEL PACIENTE

NOMBRE

Kira

ESPECIE

Perro

RAZA

Golden retriever

SEXO

Hembra

ESTADO REPRODUCTIVO

Entero

EDAD

10 años

PESO

31 kg

RESUMEN

Perra golden retriever entera de 10 años con decaimiento, falta de apetito, mucha sed y vómitos de tres días de evolución, sin secreción vulvar. El hemograma mostró leucocitosis marcada y la ecografía, cuernos uterinos distendidos con contenido. Se diagnosticó piometra a cuello cerrado y, después de estabilizarla, se hizo ovariopexia de urgencia. Alta a las 48 horas y recuperación completa a los 10 días. Caso de muestra: los datos y los autores son ficticios y las fotos son ilustrativas (Wikimedia Commons, con el crédito en cada foto).

1. Motivo de consulta

Decaimiento y falta de apetito desde hace tres días. La dueña cuenta que toma mucha más agua que antes, orina mucho y vomitó dos veces el día anterior a la consulta.



Figura 1. La paciente el día de la consulta (foto ilustrativa). Foto: Atlas815, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons; recortada.

2. Anamnesis

Perra entera, sin crías. Último celo hace seis semanas. Nunca recibió anticonceptivos inyectables. Vacunas y desparasitación al día. La dueña no vio secreción por la vulva. Vive dentro de casa y come alimento balanceado.

3. Examen físico

Temperatura 39,8 °C, frecuencia cardíaca 128 lpm, frecuencia respiratoria 32 rpm. Mucosas congestivas, tiempo de llenado capilar de 2 segundos, deshidratación estimada en 7 %. Abdomen distendido y con dolor a la palpación. Vulva sin secreción. Ganglios sin cambios.

4. Diagnósticos diferenciales

Piometra, mucometra o hidrometra, gestación, peritonitis, enfermedad renal, diabetes mellitus.

5. Pruebas complementarias

Hemograma: leucocitos 34 800/ μ L con neutrofilia y desvío a la izquierda, hematocrito 36 %. Bioquímica: urea 78 mg/dL, creatinina 1,9 mg/dL, fosfatasa alcalina 412 U/L, glucosa 96 mg/dL. Ecografía abdominal: cuernos uterinos distendidos, de hasta 4,2 cm de diámetro, con contenido anecoico a hipoeicoico y pared engrosada. Sin líquido libre en abdomen.




Figura 2. Ecografía abdominal: útero distendido con contenido, compatible con piometra. Foto: Dakiny, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

6. Diagnóstico

Piometra a cuello cerrado

7. Pronóstico

Reservado.

8. Tratamiento

Se la estabilizó durante tres horas con fluidoterapia intravenosa, antibiótico y analgesia antes de entrar a cirugía. Se hizo ovarioponectomía de urgencia por línea media. El útero salió entero, sin rotura, y pesó 2,1 kg. Se lavó la cavidad con solución fisiológica tibia y se cerró por planos. No se usaron antiinflamatorios no esteroideos por los valores renales altos.

FÁRMACO	DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	DURACIÓN
Ringer lactato	5 mL/kg/h	Intravenosa	Infusión continua	48 horas
Amoxicilina con ácido clavulánico	20 mg/kg	Intravenosa y luego oral	Cada 12 h	10 días
Metadona	0,2 mg/kg	Intramuscular	Cada 6 h	24 horas
Tramadol	3 mg/kg	Oral	Cada 8 h	5 días
Maropitant	1 mg/kg	Subcutánea	Cada 24 h	3 días




Figura 3. Útero distendido durante la ovariohisterectomía (foto ilustrativa, rótulos en inglés). Foto: Joel Mills, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

9. Evolución

A las 24 horas de la cirugía ya comía y caminaba. Alta a las 48 horas con antibiótico y analgesia por boca. Control a los 10 días: herida cerrada, retiro de puntos, leucocitos 12 400/ μ L, urea 38 mg/dL y creatinina 1,1 mg/dL. La dueña la describe activa y con el apetito de siempre.

10. Discusión

La falta de secreción vulvar no descarta una piometra: en las de cuello cerrado el contenido queda retenido y el cuadro suele ser más grave. En toda perra entera mayor que llega decaída, con mucha sed y después de un celo reciente, la ecografía abdominal es el primer estudio que pedimos. Estabilizar antes de operar y evitar los antiinflamatorios mientras los valores renales están altos ayudó a que saliera bien. Hablar de la esterilización a tiempo con los dueños evita estos casos.

11. Bibliografía

1. Hagman R. Pyometra in small animals. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 2018.
2. Fossum TW. Cirugía en pequeños animales, 5.ª edición. Elsevier, 2019.

Autorización del propietario

La autorización firmada por el propietario o tutor de **Kira** se adjunta como archivo aparte, del tipo «**Autorización del propietario**».

Ese archivo es confidencial: no se publica y solo lo ve el editor de la revista. Por eso no forma parte de este documento.

Este caso no incluye nombre, dirección, teléfono ni ningún otro dato que permita identificar al propietario, tal como piden las directrices para autores de Revista FAVET: Casos clínicos en animales de compañía.